

LEISHMANIOSE: PLAN DE CONTROLE

Qu'est-ce que la Leishmaniose?

La leishmaniose est une maladie commune à l'homme et au chien, due à l'infection des cellules du système immunitaire par un protozoaire parasite du genre leishmania.

Symptômes

Chez l'homme, elle se manifeste par des affections cutanées difficiles à diagnostiquer et prend parfois une forme viscérale qui s'accompagne, entre autre, d'une fièvre élevée et d'une anémie. Chez le chien, elle se traduit par des dermatites, des conjonctivites, des uvéites, une croissance anormale des ongles, un amaigrissement ou une cachexie. Toutefois, un chien peut être infecté sans présenter nettement les symptômes de la maladie.

La leishmania se transmet exclusivement par la piqure d'un insecte vecteur, le phlébotome, qui a été contaminé par les agents de la maladie en absorbant le sang d'un animal infecté. La contagion directe du chien à l'homme et de l'homme à un autre homme n'est pas possible. Dans le cycle biologique de la leishmania, le chien constitue le réservoir principal du virus.

Le phlébotome est actif en Vallée d'Aoste dès le mois de mai et jusqu'au mois d'octobre, du coucher au lever du soleil, et vit jusqu'à une altitude de 800 à 900 mètres.

Diagnostic

Un examen sérologique permet de diagnostiquer la maladie à partir d'échantillons de sang prélevés par le vétérinaire sur le chien suspect, qui seront analysés par la section régionale de prophylaxie animale.

AFIN QUE NOUS PARVENIONS A MIEUX CONNAITRE LA DIFFUSION DE LA LEISHMANIA, NOUS VOUS INVITONS A FAIRE VISITER VOTRE CHIEN. CHAQUE FOIS QUE VOUS AVEZ LE MOINDRE DOUTE SUR SON ETAT DE SANTE, ADRESSEZ-VOUS A VOTRE VETERINAIRE HABITUEL.

Prévention

Il n'existe, à ce jour, aucun vaccin qui permet une prophylaxie indirecte. Il faut donc mettre en œuvre une prophylaxie directe contre le vecteur, en suivant les mesures indiquées ci-après :

- mettre à l'abri les chiens pendant la nuit dans des structures sûres, dès le mois de mai et jusqu'au mois d'octobre;
- placer aux fenêtres des moustiquaire à mailles très fines ;
- pulvériser sur le chien, les moustiquaires et les rideaux, un antiparasitaire spécifique indiqué par le vétérinaire, s'assurer que le produit s'évapore lentement et qu'il soit efficace pendant toute la nuit ;
- appliquer sur votre chien un collier anti-parasites spécifique contre les phlébotomes, dès le mois de mai et jusqu'au mois d'octobre ;
- informer le corps forestier compétent ou le personnel du chenil régional (0165 34627) de la présence éventuelle de chiens en état de divagation.

En Vallée d'Aoste

En raison de ses caractéristiques climatiques, la Vallée d'Aoste offre un habitat favorable au développement du phlébotome.

Afin de mieux connaître la diffusion de la leishmaniose et de pouvoir la combattre efficacement, le Gouvernement régional a financé un plan de contrôle des chiens, établi par la Faculté de médecine vétérinaire de l'université de Turin et géré par l'UB de santé animale du Département de prévention de l'Agence USL (0165 238 770) avec la collaboration des communes de la Région : des prélèvements d'échantillons de sang seront effectués sur tout le territoire régional, afin qu'il soit possible de dresser un tableau épidémiologique de la leishmaniose en Vallée d'Aoste.

Le personnel du service vétérinaire de l'Agence USL est à la disposition des citoyens pour de plus amples renseignements concernant cette maladie.



Region Autonome Vallée d'Aoste

Assessorat de la Santé, du Bien-Etre et des Politiques Sociales

Service de la santé animale de l'Agence U.S.L.
Section régionale de prophylaxie animale de l'I.Z.S. de Turin

LA LEISHMANIOSE EN VALLEE D'AOSTE



PLAN DE CONTROLE

Une grave maladie pour le chien
Un danger pour l'homme!

